

Lesions cutànies a la pell i vermellor

● Els efectes de les picades de meduses són, bàsicament, lesions cutànies i locals que provoquen taques vermelles quan són lleus. La dermatòloga de l'hospital de Figueres, la doctora Marina Escoda, ha assenyalat que a vegades poden arribar a sortir butllofes i provocar nàusees i vòmits, però això en casos molt extrems. L'efecte es produeix amb el contacte amb la medusa que actua com una ventosa a través dels tentacles i deixa anar el seu verí. La sensació que provoca una picada és d'una cremada.

Hi ha diferents tractaments per curar la picada de medusa. Els més habituals són aplicar gel embolicat amb una bossa de plàstic i netejar la zona amb bicarbonat o aigua de mar. Llavors, també hi ha pomades antiinflamatòries. El gel, per exemple, atura el dolor i s'ha d'aplicar diverses vegades. La crema solar només fa de barrera a les cèl·lules urticàries.

La doctora Escoda ha indicat que a vegades poden quedar els tentacles de les meduses incrustats a la pell i cal treure'ls delicadament amb unes pinces. Des de Creu Roja també recomanen que si la zona afectada està botida o la persona té rampes s'acudeixi a un metge.

La major part de les picades de meduses suposen una ferida lleu que es pot solucionar en qüestió d'hores, segons la dermatòloga de l'hospital de Figueres, la doctora Marina Escoda.