Salut confirma un segon cas de Zika en una dona embarassada

Un total de 9 persones, 5 homes i 4 dones, dues de les quals gestants, tenen la malaltia, segons l'últim balanç
Tots els infectats han estat a països de l'Amèrica del Sud i Central on la transmissió del virus és activa



Un soldat brasiler reparteix pamflets de la campanya contra el Zika, dissabte a Rio de Janeiro Foto: REUTERS.

El departament de Salut de la Generalitat ha confirmat un segon cas de Zika a Catalunya en una dona embarassada.

L' últim balanç [http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/zika/1_NotaInformativa-ZK.pdf] de l'Agència de Salut Pública difós aquest dilluns eleva a 9 les persones afectades per aquesta febre vírica: 5 homes i 4 dones, dues de les quals són gestants. El passat 4 de febrer es va fer públic que una altra gestant [http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/938863-salut-confirma-la-infeccio-pel-virus-de-zika-d-una-embarassada.html?cca=1] havia contret la malaltia a Colòmbia, el primer cas d'aquestes característiques a l'Estat.

En el seu comunicat, Salut precisa que tots els casos són importats, ja que els malalts han estat recentment a zones de l'Amèrica del Sud i Central, on la transmissió del virus és activa, i han patit picades de mosquit durant la seva estada. La malaltia es transmet principalment a través dels mosquits del gènere Aedes.

La majoria dels casos de Zika s'acostumen a resoldre sense complicacions greus. El virus provoca un quadre lleu amb febre moderada; erupcions cutànies des de la cara a la resta del cos; artritis o artràlgia passatgera (principalment articulacions petites de mans i peus); conjuntivitis i símptomes inespecífics, com ara miàlgia i cansament i mal de cap. Les infeccions asimptomàtiques són freqüents; es calcula que només un de cada quatre infectats desenvolupa un quadre clínic.

Fins al 2007 es coneixien pocs casos de Zika, circumscrits a alguns països d'Àfrica i Àsia, però en l'última dècada s'ha estès a diverses illes del Pacífic i a l'Amèrica Llatina, on s'han detectat casos de transmissió autòctona.

L'impacte de la malaltia en aquests països s'ha associat a un increment en el nombre d'alteracions neurològiques en nadons. Al Brasil s'han detectat diversos casos de microcefàlia fetal en fetus i nadons nascuts de mares infectades pel virus. Aquesta relació no ha estat demostrada, però es considera altament sospitosa.

Per aquest motiu, es recomana a les dones embarassades que tinguin previst viatjar a zones on aquesta malaltia és activa que, en la mesura que sigui possible, posposin el viatge fins al final de la gestació. Si ja hi han viatjat, es convenient que ho esmentin en les seves revisions prenatals per a ser avaluades adequadament. Les

zones de risc inclouen diversos països del Carib i de Sud Amèrica i Amèrica Central, així com algunes zones de Polinèsia i de l'Àfrica equatorial.

Publicat a:

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/14-salut/941945-salut-confirma-un-segon-cas-de-zika-en-una-dona-embarassada.html?piwik_campaign=rss&piwik_kwd=nacional&utm_source=rss&utm_medium=nacional&utm_campaign=rss&f=El+Punt+Avui