# El Trueta sobresurt en cirurgia de fetge per laparoscòpia

## L'hospital de Girona aplica aquesta tècnica en un 80% dels casos en què cal extirpar un tumor del fetge
## La taxa està per sobre de la mitjana mundial, d'un 20%



Personal de la unitat hepatobiliarpancreàtica fent una intervenció per laparoscòpia al Trueta Foto: ICS GIRONA.

Apareixen menys complicacions i s'escurça l'estada hospitalària

Actualment, un 80% de les intervencions per extirpar tumors del fetge que es fan a l'hospital Josep Trueta de Girona es duen a terme amb l'ús de la tècnica laparoscòpica, que, a diferència de la tradicional (laparotomia), és mínimament invasiva. El percentatge d'ús d'aquesta tècnica en la cirurgia hepàtica situa el Trueta, l'hospital de referència de la regió sanitària de Girona, al capdavant de la xarxa d'hospitals de Catalunya, en què la mitjana oscil·la entre el 20% i el 30%, una taxa similar a la que es registra a escala mundial. "La laparoscòpia permet accedir al tumor a través de petites incisions i de càmeres. L'agressió que es fa al malalt és menor, de manera que la repercussió en la seva salut també és més lleu", explica el cirurgià Santi López-Ben, de la unitat hepatobiliarpancreàtica del servei de cirurgia digestiva del Trueta.

A l'hora d'optar per la tècnica tradicional o per la laparoscòpia, la principal indicació clínica que se segueix és la localització del tumor. Un 60% dels tumors que operen tenen l'origen en un càncer de còlon.

A més de l'aspecte quantitatiu, el cap de secció de la unitat, el també cirurgià Antoni Codina Barrera, destaca el qualitatiu, relatiu a l'èxit d'aquest tipus d'intervencions. "Els resultats són igual de bons que en les operacions tradicionals, però els pacients, majoritàriament oncològics, tenen menys complicacions postoperatòries, poden marxar abans a casa seva i tenen una millor qualitat de vida", destaca el doctor Codina. En un primer estudi dut a terme el 2014 per aquesta unitat comparant els primers cinquanta casos en què es va aplicar aquesta tècnica amb cent casos en què es va optar pel mètode tradicional, es va comprovar que es reduïen les infeccions i que l'estada mitjana a l'hospital passava de sis a quatre dies, la qual cosa també es traduïa en una reducció de costos. La taxa de reingressos va ser del 6%. En la introducció de l'estudi, es destaca que, "en comparació amb altres àrees quirúrgiques, la resecció hepàtica laparoscòpica no s'ha aplicat de manera generalitzada i actualment menys del 20% de les hepatectomies es fan per via laparoscòpica a tot el món".

Des que es va fer la primera hepatectomia per via laparoscòpica al Trueta, l'any 2005, el percentatge d'intervencions d'aquest tipus s'ha increment de manera progressiva amb els anys: s'ha passat dels 9 casos el 2010 (un 14% respecte a 64 intervencions) als 63 de l'any passat (un 80,7% de les 78 operacions). Des del 2010 i fins al 2016, s'han fet un total de 232 recessions de fetge per laparoscòpia. El 20 de juny d'aquest any, se n'havien fet 33. I les previsions són acabar el 2017 també amb un percentatge del 80%. "No ens hem inventat res. El que hem fet ha estat implantar-ho més ràpidament que altres hospitals i amb bons resultats", coincideixen a destacar els doctors López-Ben i Codina.

Publicat a:
-El Punt Avui. Comarques Gironines 26-07-2017 Pàgina 6

Font del document:
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1202621-el-trueta-sobresurt-en-cirurgia-de-fetge-per-laparoscopia.html